

donoflox[®]

LEVOFLOXACINA

antibiótico de amplio espectro

donoflox[®] 500 mg tabletas recubiertas
donoflox[®] 750 mg tabletas recubiertas

CONOCIENDO donoflox[®]

donoflox[®] es un medicamento que contiene Levofloxacin, un antibiótico activo contra un amplio espectro de bacterias, que pertenece a la familia de las fluoroquinolonas. El mecanismo de acción de la Levofloxacin, como el de otras quinolonas, consiste en la inhibición de las enzimas ADN Girasa y Topoisomerasa, que son necesarias para la replicación, transcripción, reparación y recombinación del ADN de la célula bacteriana.

QUÉ CONTIENE donoflox[®]

donoflox[®] 500 mg tabletas recubiertas

Cada tableta recubierta contiene:
Levofloxacin hemihidrato equivalente a 500 mg de Levofloxacin
Excipientes c.s.

donoflox[®] 750 mg tabletas recubiertas

Cada tableta recubierta contiene:
Levofloxacin hemihidrato equivalente a 750 mg de Levofloxacin
Excipientes c.s.

EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADO donoflox[®]

donoflox[®] está indicado en el tratamiento de:

- Infecciones del tracto respiratorio superior e inferior, incluyendo sinusitis, exacerbación aguda de bronquitis crónica y neumonías.
- Infecciones de la piel y sus estructuras como: impétigo, abscesos, furunculosis, celulitis y erisipela.
- Infecciones del tracto urinario, así como en los casos de pielonefritis aguda y prostatitis crónica bacteriana.
- Infecciones de los huesos como: osteomielitis.

CÓMO SE PRESENTA donoflox[®]

donoflox[®] 500 mg tabletas recubiertas: Se presenta en caja conteniendo 7 ó 10 tabletas recubiertas dentro de burbujas de blister que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

donoflox[®] 750 mg tabletas recubiertas: Se presenta en caja conteniendo 5 tabletas recubiertas dentro de burbujas de blister que las protegen de la humedad y de la luz ultravioleta, y el presente inserto.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía de administración oral.

La dosis puede ser distinta para los diferentes pacientes. Siga las instrucciones que le dé su médico.

A continuación se presentan las dosis promedio usuales:

donoflox[®] de 500 y 750 mg tabletas recubiertas pueden tomarse a cualquier hora del día, ya que la ingesta de alimentos no interfiere con su absorción.

La dosis para adultos con función renal normal, es de 1 tableta recubierta de 500 ó 750 mg cada 24 horas; en casos específicos cada 12 horas, según indique el médico. (Ver Tabla de dosificación incluida al dorso).

En pacientes con función renal alterada se recomienda ajustar la dosis de acuerdo a la depuración de creatinina. (Ver Tabla de dosificación incluida al dorso).

ANTES DE USAR donoflox[®] LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES E INFÓRMELE A SU MÉDICO

- Si usted es alérgico a alguno de los componentes de la fórmula, o a cualquier medicamento o comida infórmele a su médico.
- Si está tomando medicamentos que contengan calcio, magnesio y aluminio, sucralfato, cationes metálicos tales como hierro y multivitamínicos con zinc, debe hacerlo 2 horas antes o después de la administración de **donoflox[®]**, para evitar interferencia con la absorción de éste último.
- Como sucede con otros medicamentos que contienen Levofloxacin, la administración conjunta de Teofilina, Fenbuteno y antiinflamatorios no esteroideos, puede incrementar el riesgo de estimulación del sistema nervioso central pudiendo provocar crisis convulsivas.
- La administración conjunta con anti diabéticos puede ocasionar hiperglucemia o hipoglucemia.
- Consulte con el médico antes de usar éste medicamento, si tiene cálculos renales.

EN QUÉ CASOS ESTÁ CONTRAINDICADO donoflox[®]

- Pacientes con antecedentes de alergia a la Levofloxacin u otra quinolona.
- Insuficiencia renal severa.
- Pacientes con epilepsia.
- Pacientes con trastornos de tendón relacionados con la administración de fluoroquinolonas.
- No debe administrarse durante el embarazo o lactancia, ni en niños o adolescentes.

ADVERTENCIAS

- Debe utilizarse con precaución en pacientes con antecedentes de trastornos del Sistema Nervioso Central (incluyendo arterioesclerosis cerebral), alteración hepática, lesión renal y miastenia gravis.
- La Levofloxacin puede producir tendinitis (inflamación de los tendones), por lo que deberá suspenderse el tratamiento si hay dolor, inflamación o ruptura de un tendón. El riesgo de ruptura de un tendón puede estar incrementado por la co-administración de corticosteroides.
- Suspender el tratamiento con Levofloxacin, si se presenta diarrea grave, persistente y/o sanguinolenta, la cual debe ser diagnosticada si se trata de una colitis pseudomembranosa, ya que esta requiere de tratamiento inmediato.

EFFECTOS NO DESEADOS

Rara vez pueden presentarse: náusea, dolor de cabeza, diarrea, constipación, insomnio, dolor abdominal, dispepsia, mareo, vómito, vaginitis, sinusitis, fatiga, prurito, rash, dolor de espalda y pecho, flatulencia y rinitis.

USO ADECUADO DE donoflox®

- No tome más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico.
- Tome este medicamento durante todo el tiempo de tratamiento que le indicó su médico.
- Si usted olvida tomar una dosis, tómela tan pronto sea posible. Sin embargo, si está muy cerca de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de tratamiento normal. No duplique la dosis.

- Se recomienda monitoreo de glucosa sanguínea, cuando se administra en conjunto con Hipoglucemiantes orales.
- Realizar un ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz y consérvase en un lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30° C.

Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños.

Administración, dosis y venta según prescripción médica.

TABLA DE DOSIFICACIÓN

Pacientes con función renal normal				Pacientes con insuficiencia renal		
Indicación	Dosis	Frecuencia	Duración	Estado renal	Dosis inicial	Dosis subsecuente
Exacerbación de Bronquitis crónica	500 mg	Cada 24 horas	5 a 7 días	Infecciones respiratorias agudas, infecciones de la piel y tejidos blandos, Osteomielitis, Prostatitis crónica bacteriana		
Neumonía adquirida en la comunidad	500 mg	Cada 24 horas	7 a 14 días	**Dep. Cr. de 50 a 80 mL/min	No requiere ajuste de dosis	No requiere ajuste de dosis
	750 mg	Cada 24 horas	5 días			
Sinusitis	500 mg	Cada 24 horas	10 a 14 días	**Dep. Cr. de 20 a 49 mL/min	500 mg	250 mg cada 48 horas
	750 mg	Cada 24 horas	5 días			
Infecciones de piel y tejidos blandos	500 mg	Cada 24 horas	7 a 10 días	**Dep. Cr. de 10 a 19 mL/min	500 mg	250 mg cada 48 horas
Infecciones complicadas de piel y tejidos blandos	750 mg	Cada 24 horas	7 a 14 días	Hemodiálisis	500 mg	250 mg cada 48 horas
Prostatitis crónica bacteriana	500 mg	Cada 24 horas	28 días	***DPCA	500 mg	250 mg cada 48 horas
Pielonefritis aguda e *ITU complicadas	250 mg	Cada 24 horas	10 días	Infecciones complicadas de la piel y tejidos blandos		
*ITU no complicada	250 mg	Cada 24 horas	3 días	**Dep. Cr. de 50 a 80 mL/min	No requiere ajuste de dosis	No requiere ajuste de dosis
				**Dep. Cr. de 20 a 49 mL/min	750 mg	750 mg cada 48 horas
Osteomielitis	500 mg	Cada 24 horas	6 a 12 semanas	**Dep. Cr. de 10 a 19 mL/min	750 mg	500 mg cada 48 horas
Septicemia - Bacteriemia	500 mg	Cada 12 ó 24 horas	10 a 14 días	Hemodiálisis	750 mg	500 mg cada 48 horas
				***DPCA	750 mg	500 mg cada 48 horas
				Pielonefritis aguda / Infecciones del Tracto Urinario		
*ITU= Infecciones del Tracto Urinario				**Dep. Cr. mayor a 20 mL/min	No requiere ajuste de dosis	No requiere ajuste de dosis
**Dep. Cr= Depuración de Creatinina				**Dep. Cr. de 10 a 19 mL/min	250 mg	250 mg cada 48 horas
***DPCA= Diálisis peritoneal crónica ambulatoria				*ITU no complicada	No requiere ajuste de dosis	No requiere ajuste de dosis

Referencia: USPDI 2007.

LABORATORIO Y DROGUERÍA
DONOVAN WERKE
 Fabricamos Salud.



Si tiene alguna duda o comentario, comuníquese a nuestro Departamento Médico en Guatemala al PBX (502) 2412-6200 o por correo electrónico a info@donovanwerke.com
 Le invitamos a visitar nuestra página web: www.donovanwerke.com

0030816

COD. 53046